



REPUBLICA DE
CABALLISTAS LLC
EQUINE JOURNAL

ANEMIA INFECCIOSA EQUINA VIRAL.

PRO-CONTROL DE EPIDEMIOLOGÍA DE AIEV EN MEXICO

¿Qué es?



Anemia Infecciosa Equina (AIE) es una enfermedad infecciosa equina cuarentenaria internacional viral incurable, letal, sin vacuna para su prevención, que afecta de por vida a todos los équidos con prevalencia mayoritaria de infecciones y muertes de caballos; En ganado mular y asnal es menor,




La AIEV NO INFECTA A LOS HUMANOS.

El virus de AIE tiene capacidad de transmisión y de infectar a caballos, por picaduras de tabanos voladores en distancia máxima hasta de 200 metros lineales y mediante agujas, jeringas y aparatos de inyecciones endovenosas, instrumentos y equipo veterinario, contaminados del virus de AIEV utilizados por trabajadores o sus entrenadores inyectoros infectadores de AIEV de caballos, que causan mas del 90% de infecciones por uso de equipo contaminado del virus de AIEV y frecuentemente de frascos de multidosis de vitamínicos.

La AIEV mata tarde o temprano a todos los caballos infectados porque el virus letal de AIEV es inexorablemente causante de miles de muertes de caballos en Mexico y el mundo. En países que no controlan la AIEV mediante programa nacional de pruebas de laboratorio **ELISA y COGGINS** y guías sanidad animal caballar con requisito bimestral de prueba de laboratorio ELISA negativa igual a LIBRE de AIEV, la prueba ELISA se efectua en 30 minutos y prueba COGGINS en dos días, son pruebas necesarias para establecer perímetros libres certificados de AIEV institucionales, privados, municipales, estatales y nacionales.

Organos y tejidos caballares afectados

Corazón, riñones, hígado, bazo, ganglios, médula de los huesos, glóbulos blancos, entre otros.





SITUACION EPIDEMIOLOGICA ACTUAL DE AIEV SIN CONTROL EN LA REPUBLICA MEXICANA.

México está en situación indefensa contra la **ANEMIA INFECCIOSA EQUINA**, oficial y legislativamente desde el 2 de Septiembre de 2011 por acuerdo del poder judicial publicado en el

Diario Oficial de la Federación con texto: "Francisco Javier Mayorga, Secretario de SAGARPA " : Considerando que la Anemia Infecciosa Equina crónica de caballos , burros y mulas caracterizada por crisis hemolíticas febriles intermitentes y la influenza o gripe equina es de mortalidad nula; Ambas enfermedades AIEV e Influenza por sus características de diseminación se previenen con cuidado sanitario de los caballos de deporte y espectáculo, razón por el cual su impacto sanitario es escaso o NULO en este tipo de caballos".

La acción legislativa de derogación de requisito de prueba **COGGINS o ELISA** de laboratorio negativa para movilización de caballos e imposición del "**PASAPORTE MEXICANO SANITARIO Y DE IDENTIFICACION DE CABALLOS DE DEPORTE Y ESPECTACULOS**" ha situado a México en el país con mayor cantidad de infecciones y muertes de caballos por AIEV, en comparación a Colombia, Argentina, Uruguay, Brasil y Chile.

En México los caballos infectados de AIEV pueden transportarse legalmente y diseminar a la AIEV de costa a costa y de frontera a frontera de la Republica Mexicana. Además la AIEV es amenaza de transmisión e infecciones de AIEV a la ganadería caballar de Estados Unidos en la frontera con México en perjuicio del TRATADO MEXICO- ESTADOS UNIDOS- CANADA- TEMEC.



EL CONTROL DE AIEV EN ESTADOS UNIDOS ES MEDIANTE UN PROMEDIO ANUAL DE 1,200,000 PRUEBAS ELISA.



Con un promedio de 100 caballos positivos AIEV anualmente confirmados por tres pruebas ELISA positivas y dos prueba COGGINS positivas :estatal y federal para un total de cinco pruebas positivas, cuarentena inmediata y eutanasia por inyección letal endovenosa por veterinario del Estado correspondiente de caballos infectados de AIEV.



SINTOMAS


Incubación del virus en caballos infectados de 7 a 30 días.

Presentación en la mayoría caballos infectados sin síntomas o crónicos con signos intermitentes y minoría de caballos con síndrome sobreagudo que mueren en periodo máximo de 15 días.

Es un GRAN ERROR tratar de diagnosticar la Anemia Infecciosa Equina Viral mediante síntomas comunes de otras enfermedades de caballos.

En México todos los caballos con síntomas febriles o sistémicos debe de tomarse muestra de sangre para diagnosticar en laboratorio que están negativos de AIEV.

REGLA DE ORO PARA EL DIAGNÓSTICO DE AIEV



El muestreo semestral o trimestral de sangre en criaderos para pruebas de laboratorio ELISA y comprobación con prueba de COGGINS durante el primer año y después semestralmente para establecer un perímetro certificado libre de AIEV y no permitir ingreso de ganado caballar que no tenga prueba de laboratorio de AIEV vigente, con resultado negativo o libre de AIEV, la prevalencia epidemiológica de AIEV en México es hasta de 7% en comunidades rurales, 9 a 40% en caballos de raza cuarto de milla de carreras es de estados costeros Tropicales y Sub-tropicales de Latinoamérica.

En México el 0% en caballos afiliados a la FEDERACION ECUESTRE MEXICANA desde hace de 10 años por regla establecida por su presidente Dr. Jorge Berganza Linares y Dr. Sergio Salinas Navarrete, MVZ FEI-FEM, fundadores de la campaña de control y prevención de AIEV de FEM-México, mediante pruebas de laboratorio semestrales en Tecamac, Edo. México de entonces SAGARPA del gobierno Federal de México, que idealmente deberían de ser bimestrales como en Colombia, Argentina, Uruguay, Chile y Brasil.

Países de América con control de Epidemiología, Prevención, Diagnóstico y Requisito de Prueba de Laboratorio Negativa Libre de AIEV (Anemia Infecciosa Equina Viral) para transportación de caballos.



Estados Unidos



Canadá



Paraguay



Costa Rica



Uruguay



Panamá



Argentina



Colombia



Chile

ACTIVISTAS PRO-CONTROL DE EPIDEMIOLOGIA DE AIEV

Representado en orden alfabético por:

Asociación Americana de Médicos Veterinarios de Equinos, Kentucky,
República De Caballistas LLC, Equine Journal
Dr. Gerardo Aguilar, MVZ, Sonora, México,
Asociación Mexicana de Médicos Veterinarios Dentistas de Equinos, AC,
Tijuana, BC, Dr. Jorge A. Murga, MVZ, DVM,
Dra. Maria Barrandeguy, MV, Ph.D., CAMINE, Argentina,
EQCOVET y Dr. Sergio Salinas, MVZ FEI-FEM, Jalisco, México,
FESC-Cuautitlan Facultad de MV y Zootecnia, UNAM, Coronel MV Felipe Cortés,
Estado de México,
Dr. Eduardo Flores Colin, MVZ y Comité Veterinario de FEM,
Dr. Carlos Gómez Tyler, MVZ, Sinaloa, México,
Dra. Marta Monina, MV, La Plata, Argentina,
VMRD, Ed Felt, Washington, EUA,
Dra. Angela Pelzel McCluskey, DVM, MC, USDA-APHIS, Fort Collins, CO, EUA,
SADER y Laboratorio Tecamac, México,
INSTITUTO PANAMERICANO DE ANEMIA INFECCIOSA EQUINA VIRAL,
Condado de San Diego, California, Dr. Jorge Augusto Murga, MVZ, DVM.
Arnoldo Beltrán, CEO Gastroprotect LLC, Tucson, Az.

**EL VALOR DE UN CABALLO INFECTADO DE ANEMIA INFECCIOSA EQUINA ES CERO:
No compre ni venda riesgos de compra-venta de caballos infectados de AIEV,
Solicite siempre a su médico veterinario prueba ELISA y COGGINS de laboratorio.**

Infomación adicional con Dr Sergio Salinas, MVZ de EQCOVET, Jalisco,
TELS. 52 (33) 36271154 y 52 (33) 36273022 www.eqcovet.com o con
Dr. Jorge Augusto Murga, MVZ, DVM, California. Tel. +1-619-587-4501 o +1-619.587.4457

República de Caballistas LLC, Equine Journal:
Arnoldo Beltrán,  1- 915-930-9287. Email: controldecaballos@yahoo.com

AUTOR: DR. JORGE AUGUSTO MURGA, MVZ, DVM
Email: jorgeaugusto.murga@gmail.com Tel. whatsapp: +1-619-587-4501